

Questão 1(10 pontos)

Genitora refere que teve sífilis na gestação e que fez uso de penicilina benzatina 2.400.000 UI.

Relata que o parceiro não fez o tratamento. Seu RN é a termo e assintomático. Em relação à sífilis congênita responda as questões abaixo:

- a) Neste caso, quais os exames que devem ser realizados no RN ?(4 pontos, 1,0 para cada item)
- VDRL de sangue periférico
 - RX de ossos longos
 - LCR
 - Hemograma completo
- b) O RN apresentou VDRL 1 /8 e restante dos exames normais. Qual será a sua conduta?(2 pontos)
- Penicilina Cristalina endovenosa, 50.000UI/Kg/dose a cada 12h na primeira semana de vida; e a cada 8h após a primeira semana de vida.
 - Penicilina Procaína 50.000UI/Kg/dose a cada 24h IM por 10 dias.
- c) Se houver alteração liquórica ou se não foi possível colher LCR, qual conduta deve ser adotada? (1 ponto)
- Penicilina Cristalina endovenosa, 50.000UI/Kg/dose a cada 12h na primeira semana de vida; e a cada 8h após a primeira semana de vida.
- d) Caso o RN apresentar VDRL negativo, sem alterações clínicas sem alterações clínicas, radiológicas ou hematológicas qual conduta deve ser empregada.(3 pontos)
- Penicilina benzatina 50.000/Kg IM dose única.
 - O acompanhamento do RN é obrigatório incluindo o VDRL sérico seriado
 - Sendo impossível o acompanhamento, trata-se com penicilina cristalina ou procaína nas doses recomendada por 10 dias.

Questão 2 (10 pontos)

RN Masculino a termo (36,5 dias) PN = 3,410 nascido de parto normal sem intercorrências. Mãe A+ RN A+ e CD negativo, evoluiu em AC em aleitamento materno exclusivo, porém com dificuldade na pega e pouco colostro. Com 35 horas de vida notada icterícia e dosado bilirrubina que se encontrava BT = 7,5 BI = 7 BD = 0,5 orientada alta hospitalar com 40 horas de vida e retorno precoce em 2 dias.

Na consulta após dois dias no ambulatório foi notado no RN icterícia até zona IV. RN clinicamente bem, porém com o peso = 2.905 kg

a) Cite 3 fatores de risco para o surgimento desta ictericia.(3 pontos)

- RN PT tardio
- dificuldade na amamentação
- perda de peso (15%)
- Aleitamento materno exclusivo

b) Qual são os exames a serem coletados? (3 pontos)

- BTF
- provas de hemólise
- G6PD

Solicitado nesse momento bilirrubinas. BT = 19,5 BD= 0,5 BI= 19

Hemograma com esfregaço normal.

G6PD normal

Com base nas informações acima, responda:

c) Qual a provável etiologia da icterícia? (1 ponto)

- Icterícia associada ao aleitamento materno.

d) Qual a conduta preconizada?(3 pontos)

- Internamento hospitalar
- fototerapia de alta intensidade
- manter aleitamento materno
- vigiar hidratação do RN
- orientação aos pais

Questão 3 (10 pontos)

O aleitamento materno requer orientação e apoio para ser bem sucedida. Seus benefícios socioeconômicos e para a saúde da mãe e bebê são bem documentados. Em relação a amamentação responda as questões abaixo:

- a) Cite 4 contraindicações permanentes para a amamentação segundo o ministério da saúde?(4 pontos = 1 para cada item)
 - Mães infectadas pelo HIV
 - mães infectados pelo HTLV1 e HTLV2
 - bebês com galactossemia
 - uso de medicamentos e drogas incompatíveis com a amamentação (antineoplásicos, drogas ilícitas)
- b) Cite 2 hormônios que participam na fisiologia da lactação.(2 pontos)
 - Ocitocina
 - prolactina
- c) Cite 4 problemas comuns na amamentação no período pós-parto? (4 pontos = 1 para cada item)
 - trauma mamilar
 - ingurgitamento mamário
 - bloqueio de ductos lactíferos
 - mastites
 - candidíase tópica ou intraductal.
 - abscesso mamário
 - mamilos planos ou invertidos