

MÉDICO OBSTRETÍCIA - GABARITO - 14/03/2012

CASO 01

- a) Parada secundária da descida.
- b) DCP relativa ou absoluta.
- c) Cesariana.

CASO 02

- a) Pré-eclâmpsia leve.
- b) Internamento e indução do parto com misoprostol (Bishop <7)
- c) Desaceleração intraparto (DIP) variável.
- d) Taquissíntole, provavelmente devido ao misoprostol.
- e) Reversão da taquissíntole com terbutalina e repetir a cardiotocografia. Caso normal: conduta expectante; caso alterada: cesariana.

MÉDICO OBSTRETÍCIA - GABARITO - 15/03/2012

CASO 01

- a) Tocólise com nifedipina uso de corticoide para aceleração da maturidade pulmonar fetal, uso de sulfato de magnésio para neuroproteção e profilaxia intraparto para EGB.
- b) Uso de progesterona a partir de 16 semanas para prevenção do parto prematuro, devido à história de parto prematuro anterior.

CASO 02

- a) ABC (explicar cada item)
- b) Sulfato de magnésio (qualquer dos esquemas, Zuspan, Sibai ou Prittchard, desde que bem descrito e justificado)
- c) Hemograma, ureia, creatinina, ácido úrico, transaminases, bilirrubinas, DHL, glicemia, coagulograma, gasimetria, R-X do tórax
- d) Estabilizar a paciente, fazer avaliação obstétrica e definir a via de parto de acordo com as condições cervicais e a vitalidade fetal.